


# Bakteriální gastroenteritidy

Mezi **bakteriální průjemová onemocnění** patří (seřazeno podle frekvence výskytu v ČR)<sup>[1]</sup>:

- Campylobacterová enteritida (*původce: Campylobacter*).
- Salmonelová enteritida (*původce: Salmonella enteritidis, typhimurium*).
- Shigellosis (*původce: Shigella dysenteriae, flexneri, boydii, sonnei*).
- Břišní tyfus (*původce: Salmonella typhi*).
- Paratyfus (*původce: Salmonella paratyphi*).
- Cholera (*původce: Vibrio cholerae*).
- Infekce vyvolané Escherichia coli.

## Kampylobakterová enteritida

 Podrobnější informace naleznete na stránce [Kampylobakterová enteritida](#).

- **původce:** *Campylobacter jejuni* (gramnegativní tyčky),
- **rezervoár:** domácí zvířata, infikovaní lidé,
- **přenos:** kontaminovanou potravou (maso),
- **inkubační doba:** 2–7 dní,
- **klinický obraz:**  horečka, únava, bolesti svalů, vodnatý průjem, někdy s příměsí krve, křečovitě bolesti břicha,
- **diagnóza:** kultivace stolice na speciálních půdách,
- **léčba:** symptomatická, event. makrolidy,
- **komplikace:** postinfekční artritida; výjimečně orgánové postižení (hematogenní rozsev).<sup>[2][3]</sup>

## Salmonelová enteritida

 Podrobnější informace naleznete na stránce [Salmonelová enteritida](#).

- neboli **netyfová salmonelóza**,
- **původce:** *Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium* (gramnegativní tyčky),
- **rezervoár:** hovězí dobytek, prasata, kuřata,
- **přenos:** kontaminovanou potravou (vejce, maso, mléko) a pitnou vodou,
- **infekční dávka:** vysoká,
- **inkubační doba:** 10–12 hodin,
- **klinický obraz:** zvracení, vodnaté až zelené stolice, bolesti břicha, horečka, bolesti hlavy, celková slabost,
- **diagnóza:** kultivace stolice,
- **léčba:** symptomatická, event. fluorochinolony (pouze u dospělých),
- **komplikace:** septikémie, osteomyelitida, endokarditida, abscesy v měkkých tkáních.<sup>[2][3]</sup>

## Břišní tyfus

 Podrobnější informace naleznete na stránce [Břišní tyfus](#).

- **původce:** *Salmonella typhi* (gramnegativní tyčka),
- **rezervoár:** člověk,
- **přenos:** kontaktem s nemocným nebo bacilonosičem,
- **inkubační doba:** asi 2 týdny,
- **klinický obraz:** plíživý začátek; horečka, únava, bolesti hlavy, otok jazyka s bělavým nebo hnědavým povlakem, krvavé průjmy či zácpa, poté stolice vzhledu hrachové kaše, splenomegalie, porucha vědomí, červenavý exantém na kůži břicha, alterace celkového stavu,
- **diagnóza:** kultivace stolice,
- **léčba:** symptomatická (rehydratace, korekce vnitřního prostředí) a antibiotická (ampicilin či kotrimoxazol),
- **prevence:** očkování před cestou do rizikových oblastí.<sup>[3]</sup>

## Shigelóza

 Podrobnější informace naleznete na stránce [Shigellosis](#).

- neboli **bacilární úplavice**,
- **původce:** *Shigella sonnei* (v ČR nejčastější), *Sh. flexneri, Sh. dysenteriae, Sh. boydii* (gramnegativní),
- **rezervoár:** člověk (nemocný či bacilonosič),
- **přenos:** rukama znečištěnými stolicí,
- **infekční dávka:** velmi nízká,
- **inkubační doba:** 3 dny,
- **klinický obraz:** horečka, bolesti břicha, tenezmy, vodnatá stolice s hlenem a žilkami krve (akutní ulcerující

kolitida),

- **diagnóza:** kultivace stolice,
- **léčba:** symptomatická, event. kotrimoxazol, ampicilin, u dospělých fluorochinolony (ATB vhodná jen v prvních dnech choroby); izolace,
- **komplikace:** perforace tlustého střeva; meningoencefalitida, myokarditida, otitidy, pneumonie, flebitidy.<sup>[2][3]</sup>

## Odkazy

### Související články

- Antidiaroika

### Reference

1. <http://www.szu.cz/publikace/data/vybrane-infekcni-nemoci-v-cr-v-letech-1998-2007-absolutne>
2. HRODEK, Otto a Jan VAVŘINEC, et al. *Pediatric*. 1. vydání. Praha : Galén, 2002. s. 607-609. ISBN 80-7262-178-5.
3. MUNTAU, Ania Carolina. *Pediatric*. 4. vydání. Praha : Grada, 2009. s. 166-169. ISBN 978-80-247-2525-3.