

# Hypoxie plodu

## Následky

 Podrobnější informace naleznete na stránce *Hypoxie novorozence*.

Následkem hypoxie plodu mohou být:

- hypoxicko-ischemická encefalopatie (edukační problémy, abnormální vývoj, těžký handicap, někdy spojeno s azylovou péčí),
- smrt plodu.

## Prevence

Metody prevence hypoxie plodu jsou následující<sup>[1]</sup>:

- centralizace porodů do porodnic,
- činnost prenatálních poraden,
- vyčlenění rizikových stavů (komplikace předchozích porodů, preeklampsie, eklampsie, diabetes mellitus, kardiopatie,...) do specializovaných pracovišť,
- *transport in utero* u hrozícího předčasného porodu,
- *lege artis* postupy v porodnické praxi,
- intrapartální monitoring.

## Odkazy

### Související články

- Intrapartální monitorace plodu
- Kardiotokografie
- Fetální pulzní oxymetrie
- Fetální EKG

## Reference

1. KREJČÍ, Vratislav. *Kardiotokografie, poruchy děložní činnosti, hypoxie plodu* [přednáška k předmětu Gynekologie a porodnictví předstátnicová stáž, obor Všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze]. Praha. 17.2.2013.

## Doporučená literatura

- MĚCHUROVÁ, Alena. *Kardiotokografie : minimum pro praxi*. 1. vydání. Praha : Maxdorf, 2012. 183 s. ISBN 978-80-7345-274-2.



### Článek neobsahuje vše, co by měl.

Můžete se přidat k jeho autorům ([https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Hypoxie\\_plodu&action=history](https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Hypoxie_plodu&action=history)) a jej.

O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.