

Kožní lymfom

Mezi primární kožní lymfomy patří ty, které postihují v době diagnózy onemocnění pouze kůži.

Klinický obraz

Objevují se změny nespecifické a specifické. K nespecifickým řadíme exémy, pruritus. Specifické změny se objevují asi u 17% pacientů s maligním lymfomem. Vznikají na podkladě infiltrací nádorovými buňkami. Nejčastějším projevem jsou infiltrovaná ložiska kdekoli na těle nebo solitární červenofialové hrboly ve kštici.

Klasifikace kožních lymfomů

Kožní T-lymfomy

Kožní T-lymfomy	Varianty a subtypy
Mycosis fungoides	Folikulotropní MF
	Pagetoidní retikulóza
	Granulomatózní ochablá kůže
Sézaryho syndrom	
Další kožní T-lymfomy	

Kožní B-lymfomy

Kožní B-lymfomy	Varianty a subtypy
Primární kožní B-lymfom z marginální zóny	
Primární kožní B-lymfom z folikulárních center	
Primární kožní difúzní velkobuněčný lymfom dolních končetin	
Primární kožní difúzní velkobuněčný lymfom, jiný typ	Intravaskulární velkobněčný B-lymfom



Mycosis Fungoides

Odkazy

Související články

- Lymfom
- Lymfomy CNS
- Lymfom Hodgkinův

Použitá literatura

- ŠTORK, Jiří, et al. *Dermatovenerologie*. 1. vydání. Praha : Galén, Karolinum, 2008. 502 s. ISBN 978-80-7262-371-6.



Sézaryho syndrom