

Obrna



Obrna vzniká v důsledku poruchy inervace dané svalové skupiny. Dochází k částečné ztrátě hybnosti končetiny. Obrna může mít infekční i neinfekční původ.

Odkazy

Související články

- Dětská přenosná obrna
- Dětská mozková obrna
- Plegie

Hlavové nervy

- parézy N. VII: Obrna lícního nervu • Paréza nervus facialis/PGS • Paréza nervus facialis/PGS (VPL)
- parézy N. X: Paréza nervus laryngeus recurrens • Paréza nervus laryngeus superior

Horní končetina

- Obrna nervus axillaris
- Obrna nervus medianus
- Obrna nervus ulnaris
- Obrna nervus radialis

Dolní končetina

- Obrna nervus femoralis
- Obrna nervus ischiadicus
- Obrna nervus tibialis
- Obrna nervus peroneus communis

Externí odkazy

- Periferní paréza a její léčba - konzervativní, medikamentózní, rehabilitační (http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/neurologie/periferni_pareza_a_jeji_lecba_konzervativni_medikamentozni_rehabilitacni.html)
- Akutní paréza lícního nervu - srovnání klinických a laboratorních parametrů u pacientů s boreliovou a idiopatickou etiologií (<https://www.muni.cz/vyzkum/publikace/815433>)