

# **Stanovení hemoglobinu v krvi**

Stanovení hemoglobinu v krvi patří k nejzákladnějším laboratorním vyšetřením. Koncentrace hemoglobinu v krvi je hlavním kritériem pro posouzení, zda jde o anemii. Termín anémie (chudokrevnost) se používá při poklesu hemoglobinu nebo erytrocytů pod dolní limit fyziologických hodnot. Anemie patří k velmi častým klinickým nálezům. Jde o stav, který vede ke snížení vazebné kapacity pro kyslík a k následné poruše tkáňového dýchání.

## Příčiny anémie

Anemie vzniká za situace, kdy erytropoéza není schopna krýt požadavky na tvorbu nových červených krvinek. Vyvíjí se v důsledku krevních ztrát nebo zvýšeného zániku červených krvinek či nedostatečné tvorby červených krvinek. Následující přehled uvádí některé konkrétní příčiny anémie:

1. *Anemie ze zvýšených ztrát krve:*
    - Akutní ztráta krve.
    - Chronická ztráta krve.
  2. *Anemie ze zvýšeného rozpadu erytrocytů (hemolytické stavy).*
    - Autoimunitní hemolytické anémie (přítomnost protilátek proti vlastním erytrocytům).
    - Porucha membrány erytrocytů (odchylka ve složení erytrocytové membrány).
    - Dědičné enzymové defekty erytrocytů (pyruvátkináza, glukóza-6-fosfátdehydrogenáza).
    - Nestabilní hemoglobin - hemoglobinopatie (např. hemoglobin S u srpkovité anémie).
  3. *Anemie ze snížené tvorby erytrocytů.*
    - Nedostatek látek potřebných pro erythropoézu (nedostatek železa, nedostatek vitaminu B12, nedostatek kyseliny listové, nedostatek erythropoetinu – chronická renální onemocnění, nedostatek dalších látek např. vitaminů B1, B6).
    - Anemie v důsledku chemického, fyzikálního a radiačního poškození.
    - Anemie při chronických zánětlivých, infekčních a nádorových onemocněních.

Zvýšení hodnot hemoglobinu se označuje jako **polyglobulie**. Může být projevem výraznější dehydratace (*relativní polyglobulie*). S výraznější polyglobulií se nejčastěji setkáme u stavů spojených s chronickou hypoxií, např. při plicních onemocněních, vzácněji při pobyttech ve vysokých nadmořských výškách apod. Vzácně může být způsobena některými myeloproliferativními stavů, např. polycytemia vera.

## **Princip stanovení hemoglobinu v krvi**

#### *Oxidace hemoglobinu na methemoglobin:*



#### *Přeměna methemoglobinu na kyanmethemoglobin:*



Fotometrické stanovení je založeno na oxidaci dvojmocného železa v hemoglobinu hexakyanoželezitanem draselným na trojmocné železo. Vzniklý methemoglobin se v další reakci s kyanidem draselným přeměňuje na velmi stálý kyanmethemoglobin s jediným širokým absorpcním maximem ve viditelné oblasti při 540 nm.

**Hodnocení:** Referenční rozmezí koncentrace hemoglobinu v krvi(B hemoglobin) pro dospělého muže je 130–180 g/l a pro ženu 120–160 g/l.