

Véna (histologický preparát, WRF)

Pro popis preparátu viz článek véna (histologický preparát, HE).

Barvení

Weigertův resorcin-fuchsin se používá ke znázornění elastických vláken. Barví je na **tmavohnědo** až **modročerno**.

Použitá literatura

- MUDR. EIS, Václav, Štěpán MUDR. JELÍNEK a Martin MUDR. ŠPAČEK. *Histopatologický atlas* [online]. ©2006. [cit. 15.04.2010]. <<http://histologie.lf3.cuni.cz/histologie/atlas/index.htm>>.
- JUNQUIERA, L. Carlos, José CARNEIRO a Robert O. KELLEY. *Základy histologie*. 1. vydání. Jinočany : H & H 1997, 1997. 502 s. ISBN 80-85787-37-7.



Článek neobsahuje vše, co by měl.

Můžete se přidat k jeho autorům ([https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=V%C3%A9na_\(histologick%C3%BD_prepar%C3%A1t,_WRF\)&action=history](https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=V%C3%A9na_(histologick%C3%BD_prepar%C3%A1t,_WRF)&action=history)) a jej.

O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.